

う蝕予防フッ化物洗口剤

薬価基準対象外

オラブリス[®] 洗口液 0.2%

フッ化ナトリウム洗口剤

900ppmF 溶液 10mL ポーション / 500mL ボトル

溶液タイプは衛生的で手間いらず

900ppmF 溶液
500mL ボトル
新発売

集団洗口に最適!!

劇薬管理[※]
調製
溶解
不要

オラブリス洗口用顆粒11%と比較した場合

※劇薬は他のものと区別して保管しなければならない(薬機法第48条)



10mL ポーション

製剤写真には旧社名が表示されています。



500mL ボトル

ポンプは別売になります。

[別 売] 専用ポンプ(1本入)
1プッシュ 5mL

[貯 法]
10mL ポーション / 500mL ボトル
室温保存 (1~30℃)



オラブリスのQ&Aは
こちら

葛西薬工業株式会社 株式会社 ジーシー昭和薬品

オラブリス® 洗口液0.2%


〔10mL ポーション (10mL × 50個)〕
 (希望医院価格(税別)) **3,650円** (1個 (10mL) あたり73円)

〔500mL ボトル (500mL × 1本)〕
 (希望医院価格(税別)) **1,400円** (10mLあたり28円)

〈包装 : 10mL × 50個〉

〈製剤 : 10mL〉

〈製剤 : 500mL〉
 シュリンク包装



〔別売〕
 500mL ボトル
 専用ポンプ(1本入)
 1プッシュ5mL
 (希望医院価格(税別))
200円

包装及び製剤写真には旧社名が表示されています。

フッ素戦隊 オーラマン



う蝕予防フッ化物洗口剤

オラブリス® 洗口液0.2%

・詳細は電子化された添付文書をご参照ください
 ・添付文書の改訂にご留意ください
 ・2022年7月改訂(第3版)添付文書より作成

販売名	オラブリス洗口液0.2%	承認年月	2021年5月	日本標準商品分類番号	87279
一般名	フッ化ナトリウム	薬価基準収載年月	薬価基準対象外	貯法	室温保存 (1~30℃)
承認番号	30300AMX00265000	販売開始年月	10mLポーション: 2021年7月 500mLボトル: 2022年9月	使用期限	3年(容器・外箱に表示)

組成・性状		
(組成)		
有効成分	1mL中	添加物
フッ化ナトリウム	2mg	キシリトール、セチルピリジニウム塩化物水和物、クエン酸ナトリウム水和物、クエン酸水和物

(性状)
 本剤は、無色澄明な液体である。

効能・効果 / 用法・用量

- (効能・効果)
 齲蝕の予防
- (用法・用量)
 1. 毎日法
 通常フッ化ナトリウムとして0.05~0.1%溶液5~10mLを用い、1日1回食後又は就寝前に洗口する。
2. 週1回法
 通常フッ化ナトリウムとして0.2%溶液5~10mLを用い、週1回食後又は就寝前に洗口する。
- (洗口方法)
 薬液を口に含み、約30秒間薬液が十分に歯面にゆきわたるように含み洗いさせる。次に薬液を十分に吐き出させる。
 1回に口に含む液量は、年齢等による口腔の大きさ等を考慮して定めるが、通常未就学児で5mL、学童以上で7~10mLが適当である。
- (用法・用量に関連する使用上の注意)
 (1) 使用に際しては間違いなく洗口ができることを確認してから使用させること。洗口ができない場合には、水で洗口を練習させること。飲み込むおそれのある幼・小児には使用しないこと。
 (2) 飲み込まないようよく指導すること。
 (3) 指定した使用量を守るよう指導すること。
 (4) 使用方法(洗口液の調製法、洗口方法)については十分に保護者に対して説明し、家庭での幼・小児の洗口は保護者の監督下で行わせること。
 (5) 洗口液の調製法
 本剤は水溶液であり、水を加えて軽くかき混ぜることにより濃度の調整ができる。

オラブリス 洗口液0.2%の量	用法	水の量	洗口液		
			フッ化 ナトリウム濃度	フッ化物 イオン濃度	1mL中の フッ化 ナトリウム量
10mL	週1回法	調製の必要なし	0.2%	900ppm	2mg
	毎日法	10mL	0.1%	450ppm	1mg
	毎日法	30mL	0.05%	225ppm	0.5mg

- (6) 洗口の方法
 1) 1回量5~10mLを口に含み、約30秒間洗口液が十分に歯面にゆきわたるように、口を閉じ頬を動かす「ブクブクうがい」を行う(洗口図参照)。
 2) 洗口は、嚥下を避ける目的で、下を向いて行う(洗口図参照)。



- (7) 洗口時の注意
 1) 洗口の前には、歯をみがくか、水で口をすすぐこと。
 2) 洗口液1回の量は一度で口に含むこととし、口に含めなかった洗口液は捨てること。
 3) 洗口後の洗口液は十分に吐き出すこと。
 4) 洗口後30分間はうがいや飲食物をとらないようにすること。

使用上の注意

1. 重要な基本的注意
 (1) 歯科医師の指導により使用すること。
 (2) 誤って飲用し、嘔吐、腹痛、下痢などの急性中毒症状を起こした場合には、牛乳、グルコン酸カルシウムなどのカルシウム剤を応急的に服用させ、医師の診療を受けさせること。
2. 副作用
 本剤は使用成績調査等の副作用の発現頻度が明確となる調査を実施していない。
 [その他の副作用]
 以下の副作用があらわれた場合には、洗口を中止するなど、適切な処置を行うこと。
- | | |
|-----|------|
| 過敏症 | 頻度不明 |
| | 過敏症状 |
3. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
 妊娠中及び授乳中の使用に関する安全性は確立していない。
4. 過量投与
 歯の形成期〜萌出期にあたる6歳未満の小児が繰返し誤飲した場合、フッ化物の過量摂取による斑状歯が発現する可能性がある。

取扱い上の注意

- (1) 本剤の調製にはプラスチック製容器を使用すること(ガラス容器はフッ化物によって腐食する)。
 (2) ボトルは使用後すぐにキャップを閉めること。
 (3) 本剤及び濃度を調整した洗口液は子供の手の届かないところに保管すること。
 (4) 安定性試験
 最終包装製品を用いた長期保存試験(25℃、相対湿度60%RH、3年)の結果、オラブリス洗口液0.2%のポーションは室温保存において3年間安定であることが確認された。
 また、最終包装製品を用いた加速試験(40℃、相対湿度75%RH、6ヵ月)の結果、オラブリス洗口液0.2%のボトルは室温保存において3年間安定であることが推測された。

包装

ポーション 10mL×50個、ボトル 500mL×1本



製造販売元(お問い合わせ先)
株式会社 ジーシー昭和薬品
 東京都板橋区蓮沼町76番1号
 TEL:0120-648-914
 (受付時間) 9:00~17:30(土・日・祝日・弊社休日を除く)

株式会社 **松本歯科商会**
 代表取締役 **松本 渡**
 仙台市若林区木ノ下二丁目1番20号
 TEL (293) 3588 (代表)

OBP27901L
 2022年7月作成 (C-2207PW)